



Procedura di esecuzione delle irrorazioni apicali

Preparazione del formulato

I prodotti registrati per questo tipo di trattamento in ambiente urbano, vivaio e pieno campo sono Reldan LO e Runner LO, entrambi a base di Clorpirifos-metile al 22%.

Nella tabella di seguito riportata è indicata la dose di prodotto fitosanitario da diluire in 100 litri di acqua:

Prodotto fitosanitario
500 ml/hl

Riempire il serbatoio deputato allo stoccaggio del formulato con il volume d'acqua necessario, considerando che il volume di liquido utilizzato in un'irrorazione apicale è di circa 10-20 litri, a seconda della specie da trattare, della grandezza della corona e del numero di foglie presenti. Aggiungere quindi il prodotto fitosanitario, secondo la dose indicata, quindi miscelare il contenuto per favorire la completa omogeneizzazione. Si rimanda a quanto indicato in etichetta per le informazioni di sicurezza relative alla manipolazione del prodotto fitosanitario.

Esecuzione e frequenza del trattamento

Lo scopo dell'irrorazione apicale è imbibire uniformemente la parte sommitale dello stipite della palma (zona maggiormente interessata dall'attacco del punteruolo rosso) mediante un getto a bassa pressione, al fine di interessare tutta la porzione di stipite potenzialmente attaccata, ed eventualmente penetrare nelle gallerie scavate dalle larve. Tale operazione può essere effettuata mediante una pertica, previa rimozione dell'ugello di erogazione del prodotto, collegata ad un sistema di pompaggio del liquido (pompa a spalla manuale o pompa elettrica).

Riteniamo sia necessaria l'esecuzione di un'irrorazione apicale al momento dell'installazione del sistema SOSPALM®, nel caso in cui si sospetti la presenza del parassita (in caso di conclamata infestazione sarà necessario valutare l'esecuzione di una dendrochirurgia). Le irrorazioni devono essere comunque eseguite al fine di ridurre gli eventuali attacchi, in particolare si consiglia di intervenire nei seguenti casi:

- fine primavera-inizio estate e fine estate-inizio autunno (periodi di volo dell'adulto);
- nel corso dell'anno, nell'ipotesi che si verifichi un attacco laterale.

Nella fotografia di seguito riportata è illustrata la fase di trattamento.



N.B. I trattamenti da noi consigliati sono indicativi e non relativi ad una specifica situazione. Non conoscendo il grado di infestazione, non è possibile garantire l'efficacia dal risultato. G.E.A. snc non è responsabile della mancata efficacia del trattamento e di eventuali danni causati alle piante, dovuti alla non corretta applicazione del metodo.